

*2016年4月改訂
(使用上の注意の改訂)

鼻かぜ(急性鼻炎)

アレルギー性鼻炎

による諸症状の緩和に

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

くしゃみ
鼻みず、鼻づまり
なみだ目…

第②類医薬品

六活鼻炎ソフトカプセルP

六活鼻炎ソフトカプセルPは「鼻かぜ」や「アレルギー性鼻炎」による「くしゃみ」、「鼻みず」、「鼻づまり」、「なみだ目」、「のどの痛み」、「頭が重い」などの不快な症状をやわらげます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人
- (9) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
* 皮膚粘膜眼症候群 (ステイアンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5~6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分と作用】

6カプセル（成人1日量）中

成分	分量	主な作用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6.0mg	・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水のアレルギー症状を抑えます。 ・ペラドンナ総アルカロイド 鼻汁・なみだ液分泌抑制作用により、鼻みず及びなみだ目を抑えます。 ・塩酸ブソイドエフェドリン 鼻粘膜血管収縮作用により、鼻粘膜の充血を抑え、鼻づまりを解消します。 ・無水カフェイン 脳の血管に働いて、頭重感をやわらげます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg	
リゾチーム塩酸塩	75.0mg (力価)	
塩酸ブソイドエフェドリン	120.0mg	
無水カフェイン	120.0mg	

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタンを含有しています。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

【用法・用量】

次の1回量を食後水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないこと。	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児（7歳以上15歳未満）に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方（シートごと飲み込むなどのどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる可能性があります。）



【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限表示品です。表示の期限内に服用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本品に関するお問い合わせ

福地製薬株式会社

電話(0748)52-2323
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00

発売元

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造販売元

株式会社 ビオメディクス
東京都中央区京橋二丁目7番14号