

お得意様 各位

販売元 福地製薬株式会社
製造販売元 株式会社ビオメディクス「使用上の注意」の改訂のお知らせ

鼻炎内服薬

六活鼻炎ソフトカプセル P

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、平成 28 年 4 月 21 日付け薬生安発 0421 第 1 号をもって「使用上の注意事項」を改訂いたします(部:追記箇所)ので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

また、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには、若干の日時を要するものと思われまますので、この点ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改訂後 (下線部分__を追記)	改訂前																				
<p>【使用上の注意】 相談すること</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性 があります、直ちに服用を中止し、この文書を持って医 師又は薬剤師に相談してください。</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。そ の場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。</p> <table border="1"><thead><tr><th>関係部位</th><th>症 状</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症 急性汎発性発疹性 膿疱症</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤、赤くなった皮 膚上に小さなブツブツ(小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲が ない等が持続したり、急激に悪 化する。</td></tr><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr></tbody></table>	関係部位	症 状	省略	省略	皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症 急性汎発性発疹性 膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤、赤くなった皮 膚上に小さなブツブツ(小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲が ない等が持続したり、急激に悪 化する。	省略	省略	省略	省略	<p>【使用上の注意】 相談すること</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性 があります、直ちに服用を中止し、この文書を持って医 師又は薬剤師に相談してください。</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。そ の場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。</p> <table border="1"><thead><tr><th>関係部位</th><th>症 状</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症、</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤等が持続した り、急激に悪化する。</td></tr><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td>省略</td><td>省略</td></tr></tbody></table>	関係部位	症 状	省略	省略	皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症、	高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤等が持続した り、急激に悪化する。	省略	省略	省略	省略
関係部位	症 状																				
省略	省略																				
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症 急性汎発性発疹性 膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤、赤くなった皮 膚上に小さなブツブツ(小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲が ない等が持続したり、急激に悪 化する。																				
省略	省略																				
省略	省略																				
関係部位	症 状																				
省略	省略																				
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジ ョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融 解症、	高熱、目の充血、目やに、唇の ただれ、のどの痛み、皮膚の広 範囲の発疹・発赤等が持続した り、急激に悪化する。																				
省略	省略																				
省略	省略																				